

DOTACE NA PÉČI

Na údržbu lokalit s výskytem lesáka je možno čerpat dotace z těchto dotačních titulů:

- 1) Operační program Životní prostředí 2021–2027
- 2) Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu MZe
- 2) Krajinotvorné programy MŽP (např. Program péče o krajinu, program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace o jednotlivých druzích chráněných evropskou soustavou Natura 2000 a jejich rozšíření naleznete zde:

<https://portal.nature.cz> ► Datové zdroje ► Registry ► Karty druhů.



Padlý javor klen v přírodní rezervaci Voškov



Infolist s fotografiemi Pavla Šprýňara, Vladislava Holce a Daniela Čičovského vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST

www.nature.cz
www.jednapriroda.cz
dotace.nature.cz

LESÁK RUMĚLKOVÝ

Život pod kůrou



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Lesák rumělkový je silně ohrožený druh brouka **vázaného na odumírající a mrtvé dřevo** v lesích, oborách a parcích, k jehož rozkladu přispívá. Je chráněn národní i evropskou legislativou.

Jak už název napovídá, svrchu je sytě červený. Dospělec i larva mají nápadně **plochý tvar těla**, díky kterému se mohou snadno pohybovat pod kůrou stromů. Nejčastěji žijí pod kůrou topolů, javorů nebo buků a dalších převážně listnatých, ale i jehličnatých stromů. Jsou všežravci, kromě tlejícího lýka stromů se živí i podkorním hmyzem a dřevokaznými houbami. Zdravé stromy lesák neobývá – najdeme ho na stromech starých, padlých, zlomených či poškozených dřevokaznými houbami a jinými organismy.

Larvy se vyvíjejí asi dva roky pod kůrou, kde se následně kuklí. Dospělci vylézají na podzim, přezimují a brzy zjara se rozmnožují.



Larva lesáka rumělkového

Lesák rumělkový ovšem není náš jediný červený brouk s plochým tvarem těla. Na jediném místě u nás, v národní přírodní rezervaci Mionší, žije podobný, ale mnohem vzácnější lesák krvavý, který se od rumělkového liší barvou kusadel. Tvarem těla a zbarvením se trochu podobají i někteří červenáčci, ohniváčci a dlouhoústci.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- Kácení starých stromů
- Odstraňování padlých a zlomených stromů
- Vysazování nepůvodních dřevin

JAK MŮŽEME LESÁKOVI POMOCI?

- Ponecháváním starých, odumírajících a mrtvých stromů na lokalitě, tzv. nastojato
- Ponecháváním neodkorněného dřeva přirozenému rozkladu
- Vysazováním nových dřevin jako budoucího stanoviště



Národní přírodní rezervace Polanská niva – pod kůrou bychom tu našli lesáka.