

## DOTACE NA PÉČI

Na údržbu luk s výskytem modráška černoskvrnného je možno čerpat dotace zde:

**1) Agroenvironmentálně-klimatické opatření (Společná zemědělská politika 2023–2027)**

- Ošetřování extenzivních travních porostů

**2) Krajinotvorné programy MŽP (např. Program péče o krajinu, program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny)**

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace o jednotlivých druzích chráněných evropskou soustavou Natura 2000 a jejich rozšíření naleznete zde:

<https://portal.nature.cz> ►

Datové zdroje ► Registry ►

Karty druhů.



Stanoviště vhodné pro modráška černoskvrnného



Tento infolist s fotografiemi Jiřího Beneše, Marty Kobyňákové a Zdeňka Myslíka byl vydán díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Vytvořila ho Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje. Vytiskla TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. nákladem 250 ks v roce 2021. NEPRODEJNÉ.

# MODRÁSEK ČERNOSKVRNNÝ

Ekologicky náročný specialista



PŘÍRODA JE NAŠE  
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST

[www.nature.cz](http://www.nature.cz)  
[www.jednapriroda.cz](http://www.jednapriroda.cz)  
[dotace.nature.cz](http://dotace.nature.cz)

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ještě před 100 lety byl jedním z našich nejběžnějších druhů denních motýlů, dnes modrásek černoskvrnný patří ke **kriticky ohroženým druhům a vyskytuje se jen na hrstce lokalit**. Obývá jižní svahy květnatých pastvin s výskytem mateřídoušky. Dospělci i housenky se živí na rostlinách mateřídoušek a méně často dobromysli.

Pro přežití potřebují tito motýli navíc blízkou přítomnost mravenišť rezavých mravenců druhu *Myrmica sabuleti*. Housenky modráska se totiž v určité fázi vývoje nechají do mraveniště odnést, a tam se živí mravenčími larvami a přezimují. Koncem června dalšího roku opouštějí již dospělí motýli mraveniště a spatřit je můžeme až zhruba do začátku srpna.



Pro člověka je mateřídouška léčivka, pro modrásku černoskvrnného jediné místo, kde se může rozmnožovat.

## PŘÍČINY OHROŽENÍ

- Ustoupilo se od pastvy smíšených stád skotu, ovcí a koz.
- Pastviny a meze zarůstají dominantními druhy trav, které potlačují mateřídoušky a dobromysl, nebo jsou uměle zalesňovány.
- Seče se celoplošně jednou za rok, plošně se používají pesticidy a hnojiva.
- Tradiční pastviny se mění v polní kultury.

## JAK TEDY MODRÁSKU ČERNOSKVNNÉMU POMOCI?

- Obnovit velmi extenzivní pastvy ovcí a koz.
- Pást či kosit na jaře a na podzim, tedy v době, kdy motýli nelétají.
- Kosit mozaikovitě, se zachováním trsů mateřídoušek a dobromysli a kolonií hostitelských mravenců.
- Polovinu plochy osídlené modráskem černoskvrnným na rok vyjmout z pastvy.



Modrásek černoskvrnný na mateřídoušce