

DOTACE NA PÉČI o BUČINY obou typů:

○ Národní dotační programy MŽP:

POP - Program obnovy přírody, PPK - Program péče o krajinu

- Opatření vedoucí ke zlepšení druhové skladby lesa např. skupinová ochrana lesa

○ Operační program Životní prostředí (specifický cíl 1.3):

- Podaktivita 1.3.1.3 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability

○ Podpory rozvoje venkova v rámci Společné zemědělské politiky

- Lesnicko-environmentální platby, podrobnější informace na webu MZe:



○ Dotační programy jednotlivých Krajských úřadů (Podpora hospodaření v lesích)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR, KÚ nebo správy NP. Podrobnější informace zde:



NPR Jizerskohorské bučiny - jedna z nejvýznamnějších původních rezervací bukových lesů v ČR. Nejzachovalejší část bučin byla zapsána na Seznam přírodních památek světového dědictví UNESCO.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Dotace



Standardy

AOPK ČR



Informační list AOPK ČR č. 21

BUČINY

Asperulo-Fagetum a Luzulo-Fagetum

Zlatavo-stříbrné podhorské háje



Kód habitatu 9130 a 9110

Infolist s fotografiemi Martina Klauudyse, Jitky Kořínkové, Tomáše Růžičky, Jana Špinara, Jana Kašpara, Pavlína Bukáčkové a Šárky Mazánkové vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Bučiny jsou lesní porosty s **dominantním bukem lesním a příměsí dalších druhů dřevin** dle typu stanoviště, zejména **dubu a jedle bělokoré** v doprovodu s břízou, borovicí lesní, lípou, javorem. V České republice jsou hojné zejména ve středních a vyšších polohách, v nižších polohách se vyskytují ve stinných roklích a říčních údolích.

Členíme je dle **obsahu živin** v půdě na několik typů - biotopů. Nejčastěji jsou v ČR zastoupeny květnaté bučiny (*Asperulo-Fagetum*) a acidofilní bučiny a jedliny (*Luzulo-Fagetum*). Díky půdám s vysokým obsahem živin květnaté bučiny upoutají bohatě vyvinutým bylinným patrem (tzv. podrostem), zatímco na kyselých horninách převládají druhově chudší acidofilní bučiny a jedliny.



Květnaté bučiny (*Asperulo-Fagetum*) v jarním období pokryjí květy různých barev.
Vpravo shora hrachor jarní a plicník lékařský.
Vlevo kyčelnice cibulkonosná.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- **škody zvěří** na přirozené obnově porostů
- nevhodné způsoby hospodaření a obnovy porostů
- **eutrofizace** - zvyšování obsahu živin v půdě
- **ruderalizace** - změna, narušení až likvidace původního porostu

OCHRANA A PODPORA BIOTOPŮ

- udržování **nízkého stavu zvěře**
- důsledná **ochrana přirozeného zmlazení dřevin**
- využití vhodných **maloplošných, podrostních forem hospodaření**
- zajištění **stanovištně odpovídající dřevinné skladby**



Acidofilní bučiny (*Luzulo-Fagetum*) s typickým podrostem – kapradí osténkatou, bukovníkem kapradovitým