

DOTACE NA PĚČI

Na údržbu suchých stepních trávníků je možné čerpat dotace:

- **Agroenvironmentálně-klimatická opatření v rámci Společné zemědělské politiky 2023-2027**
 - podopatření Ošetřování extenzivních travních porostů

- **Národní dotační programy MŽP (např. Program péče o krajinu, Národní program Životní prostředí)**

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace zde:

Dotace



Standardy



Suchý trávník pod vrchem Srdov v EVL Oblík – Srdov - Brník



Spolufinancováno
Evropskou unií



NATURA 2000




JEDNA
PŘÍRODA

Infolist s fotografiemi Petra Lepšího a Jakuba Kyseloviče vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.

Informační list AOPK ČR č. 25

SUCHÉ TRAVNÍ POROSTY

Dědictví obecních pastvin



Kód habitatu 6210



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Suché trávníky jsou zapojené nebo mezernaté travní porosty stepního charakteru. V ČR vyskytují zejména na jižních svazích v suchých a teplých oblastech, často na vápnitém podloží (např. České středohoří, Český kras a okolí Prahy nebo Pálava), kde panují **extrémní podmínky**, v létě žár a sucho, v zimě promrzlá půda. V minulosti byly tyto porosty nejčastěji využívány jako **ovčí pastviny** (tzv. obecní pastviny) nebo **jednosečné louky**. Suché trávníky hostí **jedinečné bohatství** často vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, kteří zde nacházejí **poslední útočiště**.

Na výslunných a suchých svazích se vyskytují úzkolisté suché trávníky, kde dominují trsnaté traviny jako kostřava walliská, ostřice nízká nebo různé druhy kavylů. Na mírnějších a vlhčích svazích najdeme širokolisté suché trávníky, na kterých dominuje válečka prapořitá nebo sveřep vzpřímený. Typická je zde fauna bezobratlých, zejména **motýlů** (např. modrásci, otakárci, okáči, přástevníci a vřetenušky) a dalších druhů opylovačů, ale také **plazů** (užovka hladká), **ptáků** (dudek, linduška) a **savců** (sysel, křeček).



Shora zleva: koniklec luční český, kostřava walliská, okáč skalní, hlaváček jarní, modrásek východní

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- **upuštění od tradičního hospodaření** (pastva, sečení)
- **spad atmosférického dusíku** (má podobný efekt jako hnojení dusíkem)
- **zarůstání** konkurenčně silnými druhy trav a náletovými dřevinami
- **intenzivní hospodaření**, hnojení, dosev nevhodných druhů, orba

OCHRANA A PODPORA BIOTOPU

Přírozně vzniklé suché trávníky jsou udržovány extrémními podmínkami. Avšak suché trávníky, vzniklé pastvou hospodářských zvířat ji ke svému zachování potřebují, jinak by docházelo k hromadění odumřelé rostlinné hmoty (stařiny), vytvoření větší vrstvy půdy a následnému zarůstání konkurenčně silnými rostlinami včetně dřevin. Suché trávníky tedy ocení:

- **extenzivní pastvu** ovcí a koz (případně skotu nebo oslů),
- **sečení** (jednou ročně) a následné odstranění posečené biomasy,
- **řízené vypalování nebo hrabání stařiny**,
- **odstraňování náletových dřevin a nepůvodních druhů** rostlin a následné hospodaření.



Pastva smíšeného stáda ovcí a koz pod vrchem Brník (v pozadí Srdov) v EVL Oblík – Srdov – Brník na suchém stepním trávníku obnoveném po výřezu náletových dřevin