

DOTACE NA PÉČI o lokality s výskytem ČEJKY CHOCHOLATÉ

- **Společná zemědělská politika 2023–2027: Agroenvironmentálně-klimatické opatření**
 - Podpora biodiverzity na orné půdě – Ochrana čejky chocholaté
- **Podmíněnost a Ekoplatba (SZP):** Ochrana a péče o krajinné prvky vč. mokřadu
- **Národní programy MŽP (Program péče o krajinu, Národní program Životní prostředí)**
 - např. obnova/tvorba tůní či mokřadů, extenzivní pastva

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace zde:



Čejka ráda hnízdí v jarním obilí, které je dostatečně řídké a nízké, aby měla dobrý přehled a včas viděla predátory.

Dotace




Karty druhů



Infolist s fotografiemi Jiřího Neuderta, Martina Klauydyse, Martina Hýbnera a Veroniky Bohuňkové vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.

ČEJKA CHOCHOLATÁ

Zpívající akrobatka



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Čejka je jedním z nejrychleji ubývajících druhů zemědělské krajiny. Tento pták velikosti holuba patří do skupiny bahňáků. Její potravou jsou bezobratlí živočichové, především hmyz a žížaly.

Čejky k nám přilétají už od února, v březnu předvádějí ve vzduchu za kvílivého zpěvu svá akrobatická čísla, **hnízdít začínají v dubnu**, sezení na vejcích trvá přibližně 4 týdny. Nejčastěji hnízdí na polích nebo na pastvinách, často ve větších skupinách. Při hnízdění potřebují **nízký porost**. Mláďata jsou po vylíhnutí zcela samostatná a celá rodinka se přesouvá do **mokřadu**, kde nachází kryt a dostatek potravy. Dalším oblíbeným místem jsou polní hnojiště.

Po vyhnízdění se čejky sdružují do větších hejn a putují krajinou. Zimují v západní Evropě, kde na ně číhá nebezpečí v podobě lovců.

V letu mě poznáte
podle černobílých
zaoblených křídel



Čejka mokřady v zemědělské krajině potřebuje k úspěšnému vyhnízdění, vodí k nim svá kuřata po vylíhnutí, aby tam společně našli úkryt a potravu.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- **Vysoušení luk a mokřadů**
- **Jarní práce na polích**, při kterých dochází ke zničení hnízd
- Brzké **sečení luk v květnu**, kdy mláďata ještě nejsou schopna uletět
- Používání pesticidů, především **insekticidů**, připravuje čejky o potravu
- **Hnojení luk** způsobuje intenzivní růst trav a bylin, přes které čejky nevidí včas predátory (divoká prasata, straky, vrány)

JAK ČEJKÁM POMOCI?

- **Omezení využívání umělých hnojiv a pesticidů**
- **Ochrana polních mokřadů**, zakládání mokřadů
- Vyznačení hnízd na polích, aby nedošlo k jejich zničení zemědělskou mechanizací
- Tvorba **travnatých pásů a pásů chemicky neošetřované obiloviny**
- Extenzivní pastva zvířat
- Pozdější seč, **postup sečení** od jedné strany ke druhé nebo od středu k okrajům

Brzy po vylíhnutí už běháme za rodiči,
ale létat se naučíme až za další měsíc.



V mělkém hnízdě v louce nebo na poli se skrývají obvykle 4 vejce.