

DOTACE NA PÉČI

Na údržbu lokalit s výskytem čolka karpatského je možno čerpat dotace zde:

1) Operační program Životní prostředí 2021–2027

- Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť

2) Národní programy MŽP (např. Program péče o krajinu, Národní program Životní prostředí)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace zde:

Dotace



Karty druhů



Samice čolka karpatského



Spolufinancováno
Evropskou unií



Infolist s fotografiemi Lukáše Konečného, Petry Menclové a Radka Sejkory vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.

Informační list AOPK ČR č. 4

ČOLEK KARPATSKÝ

Tichý a nenápadný obyvatel tůňek



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na území České republiky žije 21 druhů obojživelníků. V posledních desetiletích ale počet jejich jedinců značně klesá a čolek karpatský patří mezi nejzácnější druhy. Vyskytuje se v podhorských oblastech Jeseníků a Karpat. V době rozmnožování ho najdeme například **v drobných lesních a lučních tůňkách a rybníčkách, v zatopených příkopech, kalištích zvěře či kalužích na lesních i nelesních blátivých cestách**, ale nepohrdne ani požární nádrží či zanedbaným koupalištěm. Na rozdíl od žab nevydávají čolci při námluvách žádné zvuky. Z nakladených vajíček se vylíhnou larvy, které se po dvou až třech měsících proměňují v čolky.

Většinu času mimo rozmnožování pak tráví na souši pod kameny, pod padlými kmeny, v mechu apod.



Při rozmnožování čolci potřebují, aby alespoň část tůňky byla osluněná. Víte proč? Protože samečci tančí zvláštní tanec, při kterém odlesky „zrcátek“ na ocasu lákají samičku, aby před ní mohli odložit na dno balíček spermií. V zastíněné tůňce takové představení nemusí fungovat. Osluněná tůň má také teplejší vodu a larvy čolků se pak lépe a rychleji vyvíjejí.



V takovéhle tůňce by se čolčkovi karpatskému líbilo.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- **Zánik vhodných stanovišť** způsobený lidskou činností (např. intenzivním lesním hospodařením, odlesňováním krajiny, zaspáváním kaluží na lesních cestách a zpevňováním lesních cest, odvodňováním příkopů, likvidací tůní atd.)
- **Používání pesticidů a těžké mechanizace**
- **Zarybňování** vodních ploch, které si čolek najde pro rozmnožování jako náhradu za kaluže, lesní a luční tůňky apod. (Některé ryby čolky přímo požírají, jiné se živí stejnou potravou jako čolci, takže ti potom strádají.)

JAK MŮŽEME ČOLKŮM POMOCI?

- Ochranou a péčí o vhodná vodní i suchozemská stanoviště
- Vytvářením drobných mělkých tůní
- Budováním zimovišť nebo ponecháváním hromad materiálu pro kácení na místě