

DOTACE NA PÉČI

Na údržbu lokalit s výskytem ohniváčka je možné čerpat dotace zde:

1) Agroenvironmentálně-klimatické opatření (Společná zemědělská politika)

- podopatření Ošetřování extenzivních travních porostů

2) Krajinotvorné programy MŽP (např. Program péče o krajinu)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace zde:

dotace.aopk.gov.cz



Pohled na spodní stranu křídel naznačuje, že ohniváček náleží právem do čeledi modrásků.



Infolist s fotografiemi Dušana Míčka, Johany Drlíkové a Vladislava Holce vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.

OHNIVÁČEK ČERNOČÁRNÝ

Někdo to rád kyselé



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ohniváček černočárný je chráněný druh motýla a zároveň tzv. deštníkový druh – jeho ochranou pomůžeme i dalším druhům, které mají podobné životní nároky. Je to jeden z mála druhů motýlů, **jehož početní stav se v České republice oproti minulosti zlepšil**. Ještě v polovině 20. století se vyskytoval jen na malé části Moravy, v 90. letech ji už osídlil téměř celou a poprvé pronikl do Čech. Šíření pokračovalo a dnes chybí jen v nejzápadnější části republiky.

Expanze ohniváčka se dává mimo jiné do souvislosti s používáním dusíkatých hnojiv a útlumem intenzivního chovu hovězího dobytka, což vedlo k rozšíření **širokolistých druhů šťovíků** – živných rostlin housenek ohniváčka.



Jak už název napovídá, samec (vpravo) má svrchu nápadně oranžová křídla s malými černými čárkami, samice (vlevo) je méně výrazná.

Tento motýl je také jedním z největších našich ohniváček. Dospělé motýly můžeme od dubna do září najít na **podmáčených či bažinatých loukách**, podél okrajů **vodních toků** nebo na **pastvinách s výskytem šťovíku**. Dovede však žít i na zarůstajících polích, v pískovnách či průmyslových areálech.

PŘÍČINY OHROŽENÍ

- **Intenzivní pastva** s plošným sečením nedopasků
- Několikanásobné **plošné sečení luk**
- **Odvodňování pozemků**
- Neobhospodařování luk a jejich zarůstání dřevinami
- Plošné používání chemických prostředků na hubení hmyzu

JAK MŮŽEME OHNIVÁČKŮM POMOCI?

Níže uvedená opatření pomohou kromě ohniváčka černočárného ochránit také další ohrožené druhy živočichů, které jsou vázány na nivní louky – zejména modráška bahenního a očkovaného.

- Provádět **extenzivní způsob hospodaření** spočívající v mozaikovitě seči či pastvě (například pomocí ovcí a koz).
- Ponechávat **úzké neposekané lemy** na části okrajů luk, pastvin, toků nebo cest.



Housenka ohniváčka. Tento motýl vytváří dvě generace ročně (s dospělci v dubnu až červnu a červenci až září), v extrémně teplých letech výjimečně tři.