

## DOTACE NA PÉČI

Na údržbu suchých stepních trávníků je možné čerpat dotace:

■ Agroenvironmentálně-klimatická opatření v rámci Společné zemědělské politiky

▪ podopatření Ošetřování extenzivních travních porostů

■ Krajinotvorné programy MŽP (např. Program péče o krajinu)

Pro bližší informace o vhodných dotačních programech právě pro Vás se obraťte na pracovníky příslušného regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajského úřadu nebo správy národního parku.

Podrobnější informace zde:

[dotace.aopk.gov.cz](http://dotace.aopk.gov.cz)



Standardy AOPK ČR



Suchý trávník pod vrchem Srdov v EVL Oblík – Srdov - Brník




Infolist s fotografiemi Petra Lepšího a Jakuba Kyseloviče vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited), podpořenému z finančního nástroje Evropské unie LIFE. Údaje a informace v něm uvedené vyjadřují názor či stanovisko pouze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití informací, které tento infolist obsahuje.

Informační list AOPK ČR č. 25

# SUCHÉ TRÁVNÍ POROSTY

Dědictví obecních pastvin



Kód habitatu 6210



PŘÍRODA JE NAŠE  
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

Suché trávníky jsou zapojené nebo mezernaté travní porosty stepního charakteru. V ČR se vyskytují zejména na jižních svazích v suchých a teplých oblastech, často na vápnitém podloží (např. České středohoří, Český kras a okolí Prahy nebo Pálava), kde panují **extrémní podmínky**, v létě žár a sucho, v zimě promrzlá půda. V minulosti byly tyto porosty nejčastěji využívány jako **ovčí pastviny** (tzv. obecní pastviny) nebo **jednosečné louky**. Suché trávníky hostí **jedinečné bohatství** často vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, kteří zde nacházejí **poslední útočiště**.

Na výslunných a suchých svazích se vyskytují úzkolisté suché trávníky, kde dominují trsnaté traviny jako kostřava walliská, ostrice nízká nebo různé druhy kavylů. Na mírnějších a vlhčích svazích najdeme širokolisté suché trávníky, na kterých dominuje válečka prapořitá nebo sveřep vzpřímený. Typická je zde fauna bezobratlých, zejména **motýlů** (např. modrásci, otakárci, okáči, přástevníci a vřetenušky) a dalších druhů opylovačů, ale také **plazů** (užovka hladká), **ptáků** (dudek, linduška) a **savců** (sysel, křeček).



Shora zleva: koniklec luční český, kostřava walliská, okáč skalní, hlaváček jarní, modrásek východní

## PŘÍČINY OHROŽENÍ

- **upuštění od tradičního hospodaření** (pastva, sečení)
- **zarůstání** konkurenčně silnými druhy trav a náletovými dřevinami
- **intenzivní hospodaření**, hnojení, dosev nevhodných druhů, orba

## OCHRANA A PODPORA BIOTOPU

Přírozeně vzniklé suché trávníky jsou udržovány extrémními podmínkami. Avšak suché trávníky, vzniklé pastvou hospodářských zvířat ji ke svému zachování potřebují, jinak by docházelo k hromadění odumřelé rostlinné hmoty (stařiny), vytvoření větší vrstvy půdy a následnému zarůstání dřevinami. Suché trávníky tedy ocení:

- **extenzivní pastvu** ovcí a koz (případně skotu nebo oslů),
- **sečení** (jednou ročně) a následné odstranění posečené biomasy,
- **řízené vypalování nebo hrabání stařiny**,
- **odstraňování náletových dřevin a nepůvodních druhů rostlin** a následné hospodaření.



Pastva smíšeného stáda ovcí a koz pod vrchem Brník (v pozadí Srdov) v EVL Oblík – Srdov – Brník na suchém stepním trávníku obnoveném po výřezu náletových dřevin